




台灣新視野緊急救護協會
Taiwan New Vision Emergency Medical Association



基本救命術課程

呼吸道哽塞處理




NORMAL
SWALLOWING PROCESS





時間就是腦子 Time is Brain!

- 4分鐘：腦死開始
- 4～6分鐘搶救大腦細胞黃金時間
- 10分鐘：腦死成定局





異物哽塞嚴重度與表現

- 輕度 → 不斷咳嗽（可發出聲音）
- 重度 → 咳嗽聲逐漸微弱、呼吸困難、吸氣時有高頻雜音、發紺、無法說話、全身軟弱或**兩手掐住脖子**（有意識但發不出聲音）





異物哽塞的處置

- > 1 歲（哈姆立克）
- < 1 歲（拍背壓胸）





> 1 歲的異物哽塞處置（輕度）


患者仍可呼吸

- 鼓勵咳嗽
- 避免拍打背部
- 不給喝水





> 1 歲的異物哽塞處置（重度）





> 1 歲的異物哽塞處置（意識喪失）





嚴重肥胖或孕婦

胸部推擠法

CPR 胸部按壓位置





< 1 歲的異物哽塞處置 (有意識)

拍背壓胸法





< 1 歲的異物哽塞處置 (意識喪失)

胸外按壓法




意識不清

胸外按壓法



哈姆立克法施行流程





KTUL

